


REANIMACIÓN DEL RECIÉN NACIDO EN LA SALA DE PARTOS

- 1 VALORACIÓN INICIAL
- 2 ESTABILIZACIÓN INICIAL
- 3 EVALUACIÓN INICIAL
- 4 VENTILACIÓN
- MINUTO DE ORO**
- 5 OXIGENACIÓN
- 6 COMPRESIONES TORÁCICAS
- 7 FÁRMACOS/ FLUIDOS



COMPROBAR EL MATERIAL Y LA ORGANIZACIÓN DEL EQUIPO

PARTO

1 VALORACIÓN INICIAL

- ▶ Edad gestacional
- ▶ Llanto y respiración
- ▶ Líquido amniótico
- ▶ Tono muscular



FAVORCER EL PIEL CON PIEL

- Pinzamiento del cordón tardío
- Proporcionar calor
- Asegurar la apertura de las vías
- Continuar con la evaluación



2 ESTABILIZACIÓN INICIAL

- ▶ Mantener la temperatura del RN
- ▶ Limpiar vías aéreas y aspirar secreciones
- ▶ Secar al RN para evitar hipotermia
- ▶ Estimulación táctil
- ▶ Reposicionar al neonato

FC < 100 "gaspings" o apnea



¿DIFICULTAD RESPIRATORIA?

3 VENTILACIÓN

- ▶ monitorización SpO₂
- ▶ considerar ECG

VALORAR USO CPAP monitorización SpO₂

Persiste : FC < 100



CUIDADOS POST-REANIMACIÓN

4 Asegurar maniobras de ventilación considerando la intubación

FC < 60



[O ₂] inicial 21% modificar según pulsioximetría (mano derecha)	
TIEMPO	SpO ₂
3 min	60-80%
5 min	75-90%
10 min	90-97%

5 Compresiones torácicas coordinadas con VPP 3:1

CONSIDERAR AUMENTAR FIO₂

FC < 60



- ¿ventilación inadecuada?: comprobar TET
- ¿Neumotórax?: drenar
- ¿Hipovolemia?: líquidos
- ¿Otros?

6 ADMINISTRACIÓN DE FÁRMACOS